

令和8年度 予防接種実施医療機関（学童）

大洲市が学童の予防接種を委託している病院・医院です。

☆の予防接種を受けることができます。医療機関で予約をして受けてください。

病院・医院名	所在地	電話番号	受けることのできる予防接種		
			日本脳炎2期	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	子宮頸がん※
井 関 ク リ ニ ッ ク	新 谷	25-6212	☆	☆	
おおくぼこどもクリニック	徳 森	57-9366	☆	☆	☆
大 久 保 内 科 ク リ ニ ッ ク	八 多 喜	26-1131	☆	☆	☆
大 洲 な な ほ し ク リ ニ ッ ク	東 若 宮	25-7710	☆	☆	☆
か わ ば た 産 婦 人 科	東 大 洲	23-1103			☆
菊 原 医 院	八 多 喜	26-0103	☆	☆	
こ じ ま 内 科	東 大 洲	50-8881			☆
ご と う 小 児 科	東 大 洲	23-0510	☆	☆	☆
み や う ち 医 院	徳 森	25-2333		☆	
よ し も り と レ ディ ー ス ク リ ニ ッ ク	東 若 宮	25-7780			☆
清 水 医 院	長 浜	52-2883			☆
河 辺 診 療 所	河 辺	39-2010	☆	☆	

※子宮頸がん＝ヒトパピローマウイルス感染症



大洲市定期予防接種一覧(学童)

令和8年度

予防接種の種類	対象者 及び接種間隔		標準的な接種年齢	回数	接種量	方法
二種混合(DTトキソイド)	2期	11歳~13歳未満の者(DTトキソイドを接種)	11歳	1回	0.1ml	皮下
日本脳炎 (乾燥細胞培養日本脳炎 ワクチン)	1期	初回	生後6月~90月に至るまでの間にある者 6日以上(標準28日まで)の間隔で2回	3歳	0.25ml (3歳未満)	皮下
		追加	生後6月~90月に至るまでの間にある者 1期初回2回接種後6日以上(標準おおむね1年)において1回	4歳		
	2期	9歳~13歳未満の者	9歳	1回	0.5ml (3歳以上)	
ヒトパピローマウイルス (組換え沈降9価ワクチン) ※1	小学校6年生~高校1年生相当の女子 (12歳の誕生日を含む年度の当初から16歳の誕生日を含む年度末まで) ①6月の間隔を置いて2回(15歳に至るまでに接種する場合に限る※2)。 当該方法をとることができない場合は5月以上の間隔をおいて2回 ②2月の間隔をおいて2回、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回。 当該方法をとることができない場合は1月以上の間隔をおいて2回行った 後、3月以上間隔をおいて1回※3。		中学1年生	① 2回 ② 3回	各0.5ml	筋肉内

※1 ヒトパピローマウイルスワクチンはサーバリックスあるいはガーダシルとシルガード9との交互接種における安全性、免疫原性が一定程度明らかになっていることや、海外での交互接種に関する取扱いを踏まえ、すでにサーバリックスあるいはガーダシルを用いて定期接種の一部を終了した者が残りの接種を行う場合には、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者等がよく相談した上で、シルガード9を接種する。

※2 サーバリックスあるいはガーダシルとシルガード9との交互接種になる場合は3回の接種とする。

※3 2回目の接種が初回接種から5か月後未満であった場合、3回目の接種を実施すること。この場合、3回目の接種は2回目の接種から少なくとも3月以上の間隔をおいて実施すること。

※ 長期にわたる疾患などのため、定期予防接種を受けられなかった場合の対応については、厚生労働省令で定めるとおりとする。